


大腸CT検査を受ける患者さんへ

検査3日前～2日前		(/) 検査前日				(/) 検査当日		～検査までの注意点		検査終了後									
		朝		昼		間食		夕		朝		8時以降 来院まで							
水分		水分制限はありません 多めに摂ってください		水分制限はありません。下記の水分以外にも多めに水分を摂って下さい ※アルコール・果汁・野菜ジュースはお止め下さい										起床時  水分(200ml) 脱水予防のため 朝の内服薬は 主治医の指示通りに服用して下さい		水分制限はありません 来院まで、多めに摂って下さい ※水・お茶・紅茶など (ミルクの入っていないものにして下さい)		検査後の注意事項 ※お腹の張りは、ガスを出すと楽になります 腹部をマッサージしてガスを出すようにしましょう ※脱水状態になっていることがありますので 水分をしっかり取って下さい ※食事は消化の良いものをゆっくりよく噛んで お召し上がり下さい ※しばらく下剤の効果が続くことがあります 帰宅後に血便など(血液や赤黒い便)が出た 場合やお腹の張りや痛みが強い場合は ご連絡下さい	
食事		※検査食以外は食べないで下さい										※検査までは何も食べられません 							
		朝食  +  水分(200ml)		昼食  +  水分(200ml)		間食  +  水分(200ml)		夕食  +  水分(200ml)											
				昼食後30分以内 ＜経口造影剤＞ コロنفォート1本  飲む前に よく振り混ぜて 下さい		夕食後30分以内 ＜経口造影剤＞ コロنفォート1本  飲む前に よく振り混ぜて 下さい		午前7時 ＜経口造影剤＞ コロنفォート1本  飲む前に よく振り混ぜて 下さい											
排便について		＜排便を促すために＞ ・検査前まで身体を動かしましょう ・水分をいつも以上にたくさん飲みましょう ・便意がなくてもトイレに座ってみましょう ・トイレで下腹部をくの>の字にマッサージしてみましょう  ※造影剤内服後に次の症状が出た場合は、 直ちに服用を止め、病院にご連絡下さい。 (吐き気・吐く・腹痛・顔が青ざめる・めまい・寒気・じんましん・息苦しい・顔のむくみ)										午前7時  マグコロールPを 水(180ml)に入れて よくかき混ぜ溶かして下さい 昼頃には、水のような便が数回出始めます 造影剤が混じるため、便は白っぽくなります * 13時過ぎとなっても、排便がない場合は、 各科に連絡の上、検査1時間前までに 病院にお越し下さい。						連絡先: 聖隷沼津病院 055-952-1000(代表)	